Projeções climáticas e a olivicultura

Prof^a Fabrina Bolzan Martins
e-mail: fabrina@unifei.edu.br

Instituto de Recursos Naturais
Universidade Federal de Itajubá

- A última década (2011-2020) foi a **mais quente** já registrada
- E os relatórios divulgados pelo IPCC em 2013 e 2022:

IPCC | Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, Vulnerability

Human-induced climate change is causing dangerous and widespread disruption in nature and is affecting the lives of billions of people around the world, says this Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) report. People and ecosystems least able to cope are being hardest hit. Increased heatwaves, droughts and floods are already exceeding plants and animals' tolerance thresholds, driving mass mortalities in species such as trees and corals. These weather extremes are occurring simultaneously, causing cascading impacts that are increasingly difficult to manage. They have exposed millions of people to acute food and water insecurity, especially in Africa, Asia, Central and South America, on small islands and in the Arctic. To avoid mounting loss of life, biodiversity and infrastructure, urgent, ambitious, and accelerated action is required to adapt to climate change, at the same time as making rapid, deep cuts in greenhouse gas emissions.

[IPCC Report >>](#)

Temperaturas continuarão subindo

Alteração no padrão de precipitação

Mais secas e ondas de calor

Eventos extremos

SIMULAÇÃO

PROJEÇÃO

Passado
(~1860 – 2014)

Futuro mais distante (~2030 – 2100)

Modelos climáticos são um dos principais meios para entender como o clima mudou no passado e pode mudar no futuro.

São resultados de esforços coordenados da comunidade científica de diversos países.

SIMULAÇÃO: 1995 - 2014

PROJEÇÃO:

Almazroui et al. (2021) – *Earth Sys. Environ.* 5: 155-183

SIMULAÇÃO: 1995 - 2014

PROJEÇÃO: 2040-2059 e 2080-2099

**Mudança na precipitação
(mm/ano)**

**Mudança na temperatura
média**

**Mudança na evapotranspiração
anual (mm/ano)**

**Mudança na deficiência hídrica
anual (mm/ano)**

Florêncio et al. (2022) – Ind Cro Products 188: 115538

Aumento dos extremos em Minas Gerais

Precipitação (mm/mês)

Temperatura mensal (°C)

Santos et al. (2017) – Rev. Bras. Eng. Agri Amb. 5: 155-183

- As projeções climáticas irão alterar o padrão sazonal de temperatura do ar e precipitação, podendo impactar:
 - Outras variáveis, como a evapotranspiração, disponibilidade hídrica, unidades de frio (...);
 - Padrões fisiológicos, morfológicos e anatômicos;
 - Anomalias fenológicas, duração dos estágios de desenvolvimento vegetativo e reprodutivo (dias), longevidade;
 - Crescimento, produtividade e qualidade da produção;
 - Áreas de aptidão climática de determinadas culturas, principalmente as de clima temperado;
 - Repercutindo em toda a cadeia de produção agrícola.

Tanasijevic et al (2014) - **Agr Water Manage** 144: 54-68.

Santos et al (2017) – **Rev Bras Eng Agr** 21(2): 77-82.

Tironi et al., (2017) - **Cienc Rur** 42: 2-10.

Martins et al. (2022) – **Sci Total Environ** 825: 153820

Cultivo de frutíferas de clima temperado

- A oliveira (*Olea europaea*) é uma das culturas mais importantes do mundo, com uma área total de 11 milhões de ha.
- ~5 subespécies de oliveira: *europaea*, *laperrinei* (Africa e Saara), *guanchica* (Ilhas Canárias), *cerasiformis* (Ilha da Madeira), *maroccana* (Marrocos), *cuspidata* (Leste da África)
- Origem: Bacia do Mediterrâneo

FAO (2023) - **Faostat**: database

Marotti et al. (2023) – **Plant Biol.** **23**(472): 1-16

Em produção (azeite):
 1º Espanha: > 800 mil t
 2º Grécia: 275 mil t
 3º Itália: 273 mil t

FAO (2023) - **Faostat**: database
 IOC (2024) - **IOC**: database
 Oteros et al. (2014) – **Int. J. Biom.** 57: 545 - 555

Consumo por ha (kg) de azeite):
 8º Chile
 10º Brasil
 Incluindo Uruguai (0,4 Kg/hab.), Argentina (0,2 Kg/hab.), membros IOC

Produção (azeite) fora do local de origem (HS):
 1º Argentina: 30 mil t
 2º Chile: ~25 mil t
 3º Austrália: 23 mil t
 4º Uruguai: 500 t
 Brasil: Não tem produção economicamente significativa

Consumption in kg of olive oil per inhabitant-Non IOC members

Brasil: ~600 t (22/23)
Serra Mantiqueira: 60 t (22/23)

Wrege et al. (2015) – **Rer. Bras. Frut.** 37(3): 1-12
 IOC (2024) - **IOC:** database

Source: Own elaboration based on IOC and UN, DESA, Population Division

- Primeiros plantios no Brasil ~ 1800 no Rio Grande do Sul.
- Os avanços ocorreram em 1948 pela Secretaria de Agricultura do RS + isolados por agricultores no sul de MG.
- A partir de 2005: incentivo e expansão das áreas cultivadas (e com potencial econômico) no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais;
- Atualmente na região Sudeste, 65% dos cultivos estão em Minas Gerais, 30% em São Paulo e 5% no Rio de Janeiro.

Cultivares preferidas: Arbequina, Koroneiki e Grappolo 541.

Martins et al. (2020) – **Pesq. Agr. Bras.** 55: e01852
Oliveira et al. (2012) – **Pesq. Agr. Bras.** 47(1): 30-35

Meses	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar
Desenvolvimento vegetativo	█				█						
Infloração				█							
Florescimento	26%				█						
Frutificação	66%				█						
Maturação	8%						█				
Colheita										█	

Dormência:
fundamental frio

Início de um novo ciclo veg/reprodutivo:
calor

Florescimento
~30°C
Frutificação > 25°C

Florescimento pleno e colheita:
pouca precipitação

Início da floração e frutificação plena:
muita precipitação

Martins et al (2019) – *Rev Bras Met* – 34(2): 179 - 190
 Oteros et al. (2014) – *Int. J. Biom.* 57: 545 – 555
 Sanz-Cortez et al. (2002) - *Ann Appl Biol.* 140(2): 151-157

- Atualmente, os locais mais indicados ao cultivo em Minas Gerais

Número de casos
com $T_{min} < 9,5$
 $^{\circ}C$ em JJA (a) e

$23^{\circ}C < T_{max} < 30^{\circ}$
 C na floração (d)

Regiões mais
propícias:
Sul/Sudoeste,
parte das regiões
Central e Oeste

Cidades: Andradas, Botelhos, Boa
Esperança, Campo Belo, Campos
Gerais, Cristais, Oliveira, Machado,
Maria da Fé, Monte Sião, Poços de
Caldas, Santa Rita de Caldas e São
Tomé das Letras

- As regiões propícias serão alteradas no futuro
- Mesmo com todos os avanços, o crescimento, desenvolvimento, produtividade e qualidade dos produtos da oliveira são afetados:

- **Pela variabilidade climática**

- Fatores bióticos: estresses biológicos causados por pragas, doenças e competição (quando manejado de forma errada);
- Práticas agrícolas e de manejo;
- Fatores abióticos: solos, fertilidade/nutrição.

Eventos extremos de chuva

Eventos extremos: temperatura $>35^{\circ}\text{C}$

Deficiência hídrica prolongada

Garcia et al. (2018) – **Rev. Bras. Clim.** 22: 188 – 209

Garcia-Mozo et al. (2010) – **Agr For Meteo.** 150 (4): 575-580

Santos et al. (2017) – **Rev Bras Eng Agr Amb** 21(2): 77-82

Exemplo de alterações nas áreas de aptidão climática para *Olea europaea*

Oliveira no clima presente (1980 – 2005):
disponibilidade hídrica

2041-2070

2071-2100

Aumento da DEF

Martins et al. (2020) - *Pes. Agro. Bras* 55: e01652
Santos et al. (2017) – *Rev. Bras. Eng. Agri Amb.* 5: 155-183

Exemplo de alterações nas áreas de aptidão climática para *Olea europaea*

Oliveira no clima presente (1980 – 2005):
disponibilidade frio

2071-2100

Cultivares com alta exigência em frio

Cultivares com média exigência em frio

Cultivares com alta exigência em frio

Martins et al. (2020) - *Pes. Agro. Bras* 55: e01852
Santos et al. (2017) – *Rev. Bras. Eng. Agri Amb.* 5: 155-183

←

Inapto >69%

←

Apto 1 a 5%

Clima presente 1995 - 2014

Futuro próximo 2041-2060

Futuro distante 2081-2100

Alterações na duração do tempo de permanência das mudas nos viveiros florestais

Estudo realizado para Maria da Fé (MG)

↑ 1,5°C a 4°C

Futuro próximo

Distante

Arbequina
↑ ~20 dias

Arbequina
↓ ~15 dias

Aumento nos custos para a produção de mudas entre ~ 9 % a ~137 %

- Impacto dependerá da região, genótipo/cultivar, e da fase de desenvolvimento.
- **Fundamental reduzir as vulnerabilidades futuras;**
- Necessárias medidas de adaptação, planejamento e estratégias de manejo:
 - Desenvolvimento de novas cultivares (tempo e recurso);
 - Preferência por genótipos com baixa (ou média) necessidade de frio: MGS GRAP561, 575, Arbequina, Koroneiki (MGS ASC315, MGS GRAP541);
 - Alteração dos locais de cultivo e plantio;
 - Quebra artificial da dormência (compostos naturais ou químicos ou bioestimulantes);
 - Alterações de práticas de manejo (ex. irrigação, sistemas de sombreamento, ...).

- Maior controle de pragas e doenças (ex. controle biológico ou inseticidas e fungicidas);
- Controle artificial dos ambientes de produção de mudas (irrigação, sombreamento,...);
- Aumento do tempo de endurecimento e rusticidade das mudas e aplicação de soluções de enraizamento.

Fabrina Bolzan Martins, Dr^a, Prof. Associada III, Instituto
de Recursos Naturais - UNIFEI (MG)

fabrina@unifei.edu.br